[redacted]

【不良反应】

皮肤及其附件损害：史蒂文斯-约翰逊综合征等。

(2) 神经系统损害：癫痫发作、无菌性脑膜炎等。

(3) 呼吸系统损害：急性呼吸窘迫综合征、缺氧症、支气管痉挛等。

(4) 心血管系统损害：心律失常、心动过速、心肌梗死、血管性水肿等。

(5) 血液系统损害：血小板减少症、血栓栓塞性血小板减少性紫癜、溶血反应等。

(6) 其他：发热、寒战、乏力、胸痛、背痛、肌肉痉挛、关节痛、外周水肿、过敏反应等。

【禁忌】

1. 对本品成分或其他抗生素过敏者。

2. 有抗万A抗体的透析性万A缺乏者。

【注意事项】

1. 本品专供静脉注射使用。

2. 如需要，可以用5%葡萄糖注射液稀释本品，但临床病患者应慎用。

3. 稀释至规定浓度、规定溶媒中后摇匀，目测无沉淀、无结晶析出、无变色等情况下，本品便可用。

4. 本品开瓶后，应一次输注完毕，不得分次或给第二人使用。

5. 有严重肾损伤或肾衰竭的患者应慎用。

6. 本品可能影响其他血液成分的功能，如白细胞计数、血小板计数、血红蛋白浓度、血细胞比容、凝血酶原时间、部分凝血活酶时间、纤维蛋白原、血清胆红素、血清肌酐、血清尿素氮、血清转氨酶、血清碱性磷酸酶、血清乳酸脱氢酶、血清淀粉酶、血清胆固醇、血清甘油三酯、血清钾、血清钠、血清钙、血清镁、血清氯、血清葡萄糖、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、血清尿酸、血清肌酸激酶、血清肌酸激酶同工酶、血清肌酸激酶MB、血清肌酸激酶BB、血清肌酸激酶MM、血清肌酸激酶总活性、血清肌酸激酶同工酶活性、血清肌酸激酶MB活性、血清肌酸激酶BB活性、血清肌酸激酶MM活性